体检查出肝囊肿别慌! 普外科医生教你正确应对

⊙彭州市中医医院 吴嘉宸

在日常体检中,肝囊肿的检出率不算低。不少人看到"囊肿"俩字就慌了——这病是咋来的?用不用治? 真要治的话该咋做?实际上,肝囊肿是肝脏内出现的囊性病变,就像肝脏里长了个"小水泡"。很多人在发现它 时,会担心是否与生活习惯、饮食有关,甚至忧虑会不会发展成严重疾病。今天我就从普外科医生的角度,用通 俗的话给大家讲清楚肝囊肿的那些事、帮大家轻松应对这个常见问题。

多数肝囊肿是良性的

肝囊肿就是肝脏里长了一个 "装液体的小囊"。这个囊腔大小 不一,一般是圆形或椭圆形,里面 装的是清澈的液体。它大多时候 "安安静静"的,不痛不痒,早期 也很少有明显症状, 很多人都是体 检时偶然发现的。肝囊肿的形成原 因比较复杂,可能和遗传、肝脏局 部代谢异常、外伤或感染等因素有 关。不过大家不用怕,大多数肝囊 肿是良性的,很难发展成癌症,不 用过度焦虑。

大部分肝囊肿患者没有任何 不舒服的感觉, 都是做超声、CT 或MRI检查时意外发现的。只有当 囊肿长得比较大时,才可能出现一 些不适:比如右上腹部隐隐作痛或 有坠胀感, 甚至可能影响消化, 出 现食欲减退、恶心等症状。极少数 特别大的囊肿,还可能压迫周围器 官,导致肚子看起来胀、体重有变 化——但这种情况很少见。如果出 现持续的不舒服,一定要及时去看 医生, 医生可能会建议进一步检 查,确认囊肿的性质。

肝囊肿主要分两大类,搞清 楚类型能帮我们更好判断风险。 单纯性肝囊肿(也叫"原发性肝囊 肿"):这是最常见的类型,大多 是肝脏正常细胞分泌液体形成的,

通常对身体无害;继发性肝囊肿比 较少见,一般是肝脏感染、肝脓 肿、肝脏外伤等问题后引发的。需 要特别注意的是,虽然大部分肝囊 肿是良性的, 但少数可能和肝癌或 其他肝脏疾病有关, 所以正确诊 断、分清囊肿类型很重要。

关键问题: 肝囊肿需要治疗吗

小肝囊肿(直径<5厘米): 如果肝囊肿直径小于5厘米,而且是 单纯性的,一般不需要特殊治疗。 这类小囊肿就像肝脏里的"小水 泡",是正常组织或细胞液体积聚 形成的,不会对肝脏功能造成实质 影响,也不会有明显症状。这种情 况不用过度担心, 但要定期体检, 观察囊肿有没有变大、有没有异常 变化: 平时保持健康的饮食和生活 习惯,也能帮助预防囊肿增大。

大肝囊肿(直径>5厘米): 当囊肿直径超过5厘米时,就有可能 出现"压迫问题"——比如导致腹 部不适、消化不良、食欲减退, 甚 至影响其他腹部器官,或对肝脏功 能造成影响。这时医生会根据具体 情况,建议采取治疗措施,常见的 有3种:

穿刺抽液:用细针把囊肿里的 液体抽出来, 让囊肿变小, 缓解压 油。

硬化治疗: 抽完液体后, 医生 会往囊肿里注入药物, 让囊肿壁慢 慢闭合, 防止囊肿复发。

手术切除:这种情况很少见, 只有当囊肿症状特别严重、用其他 方法难以消除时,才会考虑手术。

要注意的是,哪怕是不用治疗 的小囊肿, 也需要定期"复查", 看看它有没有变化。医生一般建 议,每6个月到1年做一次肝脏超 声检查,确认囊肿有没有变大、有 没有新的症状或问题。随访的目的 是"早发现风险"——如果复查时 发现囊肿变大了,或者出现了腹部 不适、消化问题等症状, 医生会讲 一步评估囊肿性质,必要时及时处 理,避免引发并发症。

总的来说, 肝囊肿是很常见 的肝脏问题,大多时候良性、不惹 事,不会引发严重健康问题。直径 小干5厘米的, 定期检查+健康生活 就行; 就算是直径超过5厘米的, 需要治疗时也有安全有效的方法, 能缓解症状、防止恶化。不管囊肿 大小, 定期随访和医生保持沟通都 很关键——这样能及时发现潜在变 化,确保肝脏健康。只要科学管 理、保持好心态, 肝囊肿完全不会 成为生活的"大麻烦",大多数患 者都能保持良好的生活质量。◎